



برسیم کا گلاؤ

(Stem & Crown Rot)

ڈاکٹر سلیم الیاسین - آفتاب احمد خان - محمد سلیم اختر - محمد شکیل حنیف



ادارہ تحقیق چارہ جات سالہ نمبر 5 سرگودھا
048-3712653

برسیم کا کلاؤ (Stem & Crown Rot)

برسیم کی فصل میں پودے کا کلاؤ ایک پھپھوندی کی وجہ سے ہوتا ہے جسے سکلیورٹینا ٹریفولیم (Sclerotinia trifolium) کہتے ہیں۔ یہ بیماری پچھلے چند برسوں سے برسیم پر دکھی گئی ہے اس بیماری کی ابتدا پتوں پر چھوٹے چھوٹے بھورے دھبوں کی شکل میں ہوتی ہے اور بعد ازاں پتوں کی رنگت سرخسی مائل سبز ہو جاتی ہے۔ پودے کے پتے کلاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں پودے کا تنا بھی اسی طرح تیزی سے کلاؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ چند دنوں میں پورا پودا گل جاتا ہے جس پر سفید پھپھوندی کی اس قدر افزائش ہو جاتی ہے کہ پودے کی بجائے صرف پھپھوندی ہی دکھائی دیتی ہے۔ پودے کی تمام تر خوراک استعمال کر چکنے کے بعد پھپھوندی سخت جان قسم کے شمری مخزن پیدا کرتی ہے جنہیں اصطلاحاً سکلیورٹیا (Sclerotia) کہتے ہیں۔ یہ سکلیورٹیا پودے کے ارد گرد کی زمین پر گر جاتے ہیں موسمی حالات ملاز کار ہونے کی صورت میں سکلیورٹیا دوبارہ متحرک ہو کر نہایت چھوٹی چھوٹی نمبالے رنگ کی گھمبیاں بناتے ہیں جو مشکل دکھائی دیتی ہیں ان گھمبیوں سے ایسکو سپور (Ascospore) پیدا ہوتے ہیں جن سے بیماری پھراگے بوہتی ہے۔ زمین کی ناقص تیاری سے پیدا ہونے والے غیر ہموار گھیت اور ختموں کی چھاؤں یا کھیت میں زیادہ نمی بے جا شرح بیج سے پودوں کی زیادہ تعداد دکھاؤں کا غیر متناسب استعمال اور کٹائی کے بعد کئے ہوئے پودے اور پتے وغیرہ گرے رہنے سے اس بیماری کو بڑھوتری ملتی ہے۔



روک تھام اور تدارک

بیج کی شرح 6 تا 8 کلوگرام فی ایکڑ رکھیں اور کاشت سے پہلے بیج کو پھپھوندی کش زہر بحساب 2 تا 3 کلوگرام فی کلوگرام بیج کا کریں۔ زمین میں صرف ایک دفعہ گہرے ٹل سے مٹی پلٹنے سے بیماری کا حملہ کم ہوتا ہے کھیت میں جڑی بوٹیوں کی تلفی بالخصوص چوڑے پتوں والی بوٹیاں تلف کریں۔ فصل کی کٹائی میں زیادہ وقفہ نہ کریں اور گرے ہوئے پودوں اور پتوں کو چھن لیں۔ شہریدہ حملے کی صورت میں کٹائی کے بعد کاربنڈ ازوم بحساب 200 کلوگرام فی ایکڑ 100 لیٹر پانی میں حل کر کے پھرے کریں اور دو ہفتے بعد کٹائی کریں۔