

ترشاوہ باغات کی بہتری کیلئے کام کا ماہانہ شیڈول

جنوری



☆ جن باغات سے پھل توڑا جا چکا ہو وہاں کانٹ چھانٹ کا عمل مکمل کریں۔ سوکھی، بیمار ٹہنیاں و کچے گلے درختوں پر نہ رہنے دیں۔

☆ گلدھیزی کے بچوں پر نظر رکھیں جہاں نظر آئیں بذریعہ سپرے کنٹرول کریں کلور پائری فاس 2.5 ملی لیٹر یا میتھیلڈا تھیان 2.5 ملی لیٹر یا پروفینوفاس 2.5



☆ ملی لیٹر فی لٹری پانی کے حساب سے درختوں کے تنوں پر سطح زمین سے دو سے اڑھائی فٹ اونچائی تک اور پودے کی چھتری کے نیچے زمین پر سپرے کریں

☆ پودوں کو دھند کے مضر اثرات سے بچانے کا اہتمام کریں خصوصاً باغات کے گرد اگر دبانس وغیرہ یا لہجے قد کے جو درخت لگے ہوئے ہوں

☆ ان کی چھدرائی و کٹائی کریں تاکہ باغات میں روشنی و ہوا کا گذر ہو۔

فروری



☆ عمل کانٹ چھانٹ بہتر پھل کے حصول کیلئے جاری رکھیں۔ سٹرس سکیب، میلا نوز، کینکرو، دیگر بیماریوں کے تدارک کیلئے یہ امر بہت ضروری ہے کانٹ

چھانٹ شدہ ٹہنیوں وغیرہ کو جلا دیں۔



☆ ان بیماریوں کے تدارک کیلئے درج ذیل زہروں میں سے کسی ایک پھپھوندی کش زہر کا سپرے کانٹ چھانٹ کے فوراً بعد کریں بورڈیکس یکس 1

فیصد یا کوسائیڈیا 100 پیسٹ بھسب 2.5 گرام فی لٹری پانی یا تھائیوفینٹ متھائل 2 گرام یا ڈائی فینا کونا زول 0.5 ملی لیٹر فی لٹری پانی کی شرح سے سپرے کریں

مارچ



☆ مارچ کے آخر میں پھل کی خاصیت کو خراب کرنے والے کیڑے مکوڑے مثلاً تھرپس، ایف مائز، تیتلا، ایسٹرن ٹیٹلا وغیرہ مختلف بیماریوں مثلاً سٹرس سکیب

، سٹرس میلا نوز اور سٹرس کینکرو کے خلاف درج ذیل زہروں کے ملاپ کے مطابق سپرے کریں۔ (ٹریسر) سپائٹوسید 20 سی سی فی 100 لٹری پانی +

ٹائسن ایم 200 گرام فی 100 لٹری پانی یا (ریڈینٹ) سپینٹوران 20 سی سی فی 100 لٹری پانی + نیٹیو (Nativo) 30 گرام فی 100 لٹری پانی

یا لیوفینوران 200 ملی لیٹر فی 100 لٹری پانی یا ایمیکشن 250 ملی لیٹر فی 100 لٹری پانی + ایزاکسی اسٹروبن 100 ملی لیٹر فی 100 لٹری پانی

☆ سپرے سے پہلے باغات میں ہر صورت عمل کانٹ چھانٹ مکمل کریں تاکہ سپرے کا موثر فائدہ ہو۔

اپریل



☆ پودوں کے تنوں پر بورڈیکس پوسٹ نیلا تھوٹھا ایک کلو، ان، بھاجا چونا دو کلو اور پانی 12 لٹر (12:2:1) سطح زمین سے دو سے اڑھائی فٹ تنے کی اونچائی

تک لگائیں تاکہ موسم گرما میں درختوں کے بڑے تنوں کی چھال پھٹنے نہ پائے۔

☆ پھل بننے کے بعد سٹرس تھرپس، سٹرس سلا، سٹرس میلا نوز و سٹرس سکیب کے خلاف درج ذیل میں سے زہروں کے کسی ایک ترکیب (ملاپ) کا

حفاظتی سپرے کریں تاکہ کیڑے مکوڑے اور بیماریوں کا موثر تدارک ہو سکے۔ امیڈا کلو پڑ 100 سی سی فی 100 لٹری پانی + ایزاکسی اسٹروبن 100

ملی لیٹر فی 100 لٹری پانی یا کلور فینا پائری 50 سی سی فی 100 لٹری پانی + کیریو ٹاپ 200 گرام فی 100 لٹری پانی یا (ریڈینٹ) سپینٹوران 20 سی سی فی

100 لٹری پانی + نیٹیو (Nativo) 30 گرام فی 100 لٹری پانی یا کور فینا پائری 50 سی سی فی 100 لٹری پانی یا لیوفینوران 250 ملی لیٹر فی 100 لٹر

پانی + ریلی (Rally) 20 گرام فی 100 لٹری پانی یا فائٹ 250 ملی لیٹر فی 100 لٹری پانی + سیکسیس (Success) 250 گرام فی 100 لٹری پانی



مئی

☆ اگر بارشوں کا سلسلہ جاری رہے تو بورڈیکس یکس 1 فیصد یا کوسائیڈیا کو باکس بھسب 3 گرام فی لٹری پانی سپرے کریں۔

☆ سٹرس سلا اور ایسٹرن ٹیٹلا کے کنٹرول کیلئے نوسار بھسب 1.5 ملی لیٹر فی لٹری پانی سپرے کریں۔

جون

☆ جن درختوں سے گدھیزی بالغ حالت میں زمین پر آگئی ہو وہاں ہلکی گوڈی کر کے انڈوں کو تلف کریں۔



جولائی

☆ پھل کی کوکنٹرول کرنے کیلئے جنسی پھندے 8۳6 فی ایکڑ لگائیں۔

☆ بانغات کے ارد گرد ہوا توڑ باڑیں لگانے کیلئے نیم کے پودے بانغات کے گرد لگائیں۔



☆ پھپھوندی سے پھیلنے والی بیماریوں پر نظر رکھیں اور بارشیں جب شروع ہو جائیں اور ان میں وقفہ آتے ہی سٹرس سکیب، سٹرس میلا نوز، سٹرس

کینکر اور سرسوک (سٹرس ودرپ) کے تدارک کیلئے مناسب پیرے کریں



☆ موسم برسات میں سٹرس سلا یعنی تیلہ، سٹرس سکیلز، کانٹیکشن سکیلز کے تدارک کیلئے درج ذیل میں سے کسی ایک زہر کا استعمال کریں بارڈر 2.5

ٹی لٹرنی لٹرنی یا نو اسٹار 1.25 ٹی لٹرنی لٹرنی کی شرح سے کریں اور ہر سپرے مشین میں ایک چمچ صرف ضرور ملائیں۔



☆ کانٹیکشن سکیلز کیلئے نیم آئل بحساب 10 ٹی لٹرنی لٹرنی کے حساب سے پیرے کرنے سے موثر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔

اگست

☆ انحطاط پذیری کی طرف مائل پودوں کو جو ہات انحطاط پذیری کے اسباب جاننے کے بعد ان پودوں میں درج ذیل ادویات کا ملاپ پیار شدہ

ٹھینوں کی کانٹ جھانٹ کے بعد ڈالیں۔ رگی 70 گرام + کا پرسلیفٹ 250 گرام + ریڈول گولڈ 80 گرام + ہیوٹک ایسڈ 2 کلوگرام فی



بڑا پودا ڈال کر پانی لگادیں۔

☆ سٹرس سکیب، سٹرس میلا نوز اور سٹرس کینکر کی روک تھام کیلئے بورڈوکسپر 1 فیصد یا چھین (کا پر ہائیڈرو آکسائیڈ) 3 گرام فی لٹرنی یا نیٹیو و

(Nativo) 65 گرام فی 200 لٹرنی یا ایزا کسی اسٹروین 1 ٹی لٹرنی لٹرنی کی شرح سے پیرے کریں۔



☆ تیلے دوسرے رس چوسنے والے کیڑوں کے تدارک کیلئے امیڈاکو پڑ 1.25 ٹی لٹرنی یا ایسٹامپیر ڈ 1.25 ٹی لٹرنی لٹرنی کے حساب سے پیرے کریں۔

ستمبر

☆ مختلف کیڑے کونڈوں مثلاً سٹرس لف مائز، تیلے و دیگر رس چوسنے والے کیڑوں کے انسداد کیلئے ایسٹامپیر ڈ بحساب 1.25

ٹی لٹرنی یا نو اسٹار 1.25 ٹی لٹرنی لٹرنی کی شرح سے پیرے کریں۔



☆ سٹرس سکیب یا سٹرس میلا نوز کے انسداد کیلئے ای می سٹار ٹاپ 1 ٹی لٹرنی لٹرنی یا ایزا کسی اسٹروین 1 ٹی لٹرنی لٹرنی یا نیٹیو و (Nativo) 65

گرام بحساب 200 لٹرنی کی شرح سے پیرے کریں۔

اکتوبر

☆ سٹرس سکیب و میلا نوز کے کنٹرول کیلئے نیٹیو و (Nativo) بحساب 65 گرام فی 200 لٹرنی یا ریلی (Rally) 40 گرام فی 200 لٹرنی

کی شرح سے پیرے کریں۔



☆ پودوں کے تنوں پر کیلینڈر میں بیان کردہ تناسب کے لحاظ سے سطح زمین سے دو سے اڑھائی فٹ تک پیٹ کر دیں۔

نومبر

☆ مالنے کی مختلف اقسام کی برداشت شروع کر دیں اور بعد از برداشت ان کی کانٹ جھانٹ کرنے کے بعد کسی بھی پھپھوندی کش دوائی ترجیحاً ایلینٹ

2.5 گرام فی لٹرنی یا کا پر آ کسی کلو رائیڈ بحساب 3 گرام فی لٹرنی کی شرح سے پیرے کریں۔



☆ گرے ہوئے تمام پھل کو تلف کر دیں خصوصاً ایسا پھل جو بیماری یا کیڑے کے پھوٹوں سے متاثر ہو۔

☆ گدھیزی کے انڈوں کی تلفی کیلئے پودوں کے ارد گرد ہلکی گوڈی کریں۔

دسمبر

☆ گدھیزی کے انڈوں میں سے نکلنے والے کیڑوں کو تلف کرنے کیلئے مناسب زہروں کا سپرے کریں اور یہ سپرے اسی جگہ تک محدود رہے جہاں

گدھیزی کے بچے نظر آئیں۔ ترجیحاً سطح زمین سے درخت کے بڑے تنے پر 3 فٹ اونچائی تک کلو رو پائری فاس یا پرو فینوناس 2.5 ٹی لٹرنی لٹرنی



پانی کا سپرے گدھیزی کے بچوں کو تلف کرنے کیلئے ضروری ہے۔

☆ جن پودوں پر بچ (Citrus Greening) سے متاثرہ پھل نظر آئے تو ان کی نشاندہی کر کے تلف کر دیں۔