

محکمہ زراعت  
حکومت پنجاب

# کنو کے معیاری (بیماریوں سے پاک) پھل کا حصول وقت کا اہم تقاضا



## سفارشات:

- 1- پھل برداشت کرنے کے بعد فوری طور پر کانٹ چھانٹ کریں۔ پودے پر کوئی سوکھی، بیماری سے متاثرہ اور مردہ لکڑی نہ رہے (باریک سوک کا ختم کرنا بہت ضروری ہے)
- 2- کانٹ چھانٹ کے فوراً بعد سپرے کریں تاکہ سابقہ بیماری کے جراثیم ختم ہو سکیں اور آئندہ پھل تندرست اور بیماریوں سے پاک ہو۔
- 3- باغات سے گیرے ہوئے پھل کو اکٹھا کر کے گہرا گڑھا کو دگر دیا جائے اور اس کو مٹی کی موٹی تہہ سے ڈھانپ دیں درج بالا عمل کرنے کے بعد ان زہروں کا سپرے کریں۔  
بورڈیکس مکسپر (1:1:100) یعنی ایک کلوگرام نیلا تھا + ایک کلوگرام چونا + 100 لٹر پانی کے تناسب سے تیار کریں۔ یاد رہے کہ 400 لٹرنی ایکڑ پانی ضرور استعمال کریں اور اسی نسبت سے نیلے تھو تھے اور چونے کی مقدار بڑھائیں۔  
یا کو سائیڈ 2.5 گرام یا چمپین 3 گرام فی لٹر پانی
- 4- اس دوران کھادوں کا استعمال کریں۔



1 کلوگرام نی پودا ڈی اے پی + 1 کلوگرام نی پودا ایس او پی  
(زیادہ کلر اٹھی زمین میں سنگل سپر فاسفیٹ کو ترجیح دیں)

- 5- فروری، مارچ پھوٹ آنے پر کیڑوں کے حملہ کیلئے امیڈا کلوپرڈ بحساب 2 گرام فی لٹر پانی کے حساب سے سپرے کریں اس کے ساتھ ایزاکسی سٹرابین (Azoxystrobin) 2 ملی لٹر بھی ملا لیں۔
- 6- پھول کی 70 فیصد پتیاں گرنے کے بعد یعنی 15 تا 30 اپریل کا وقت جو کہ بیماریوں کے پھیلاؤ کیلئے سب سے زیادہ نازک وقت ہے۔ لہذا درج ذیل سپرے ہر صورت کریں۔  
کو سائیڈ یا چمپین 4 گرام فی لٹر پانی یا بورڈیکس مکسپر کا سپرے کریں۔  
(تین ہفتے بعد درج بالا سپرے دہرائیں)
- 7- تھرپس، مائٹس کی وجہ سے کڑا بننے کے خلاف درج ذیل سپرے کریں۔  
کلوروفینا پائر 1 ملی لٹر فی لٹر پانی یا سپنوران 20 ملی لٹر فی لٹر پانی یا سپانوسٹ 20 ملی لٹر فی لٹر پانی
- 8- اپریل میں پھل بننے کے بعد نائٹروجن کھاد ضرور استعمال کریں۔



امونیم سلفیٹ 2 کلوگرام نی پودا یا امونیم نائٹریٹ 1.75 کلوگرام نی پودا



9۔ اپریل، مئی میں عناصر صغیرہ (Micronutrients) کا سپرے درج ذیل تناسب سے فی 100 لٹر پانی کریں اور فی ایکڑ سپرے محلول کی مقدار کم از کم 300 لٹر ہو اور عناصر صغیرہ کی مقدار بھی پانی کے حساب سے بڑھا لیں۔

زنک سلفیٹ	300 گرام	مینگا نیئر سلفیٹ	140 گرام
بوریکس	50 گرام	میکینیشیم سلفیٹ	250 گرام


10۔ مون سون قبل از وقت شروع ہونے کی صورت میں جون، جولائی میں بورڈ و مکسچر کا سپرے ضروری ہے۔

11۔ بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی صورت میں بورڈ و مکسچر کا سپرے کر دہرائیں۔

12۔ اگست میں نائٹروجن کھادا مونیم سلفیٹ 2 کلوگرام یا امونیم نائٹریٹ 1.75 کلوگرام نومبر دسمبر میں گو بر کی کھادا بحساب 40-60 کلوگرام فی پودا ضرور ڈالیں۔

13۔ اگست ستمبر میں پھل پر حملہ آور ہونے والی بیماریوں کے خلاف تھائیوفینٹ متھائل یا پائی روکلو سٹرابن بحساب 2 گرام فی لٹر پانی کے حساب سے سپرے کریں۔

### ستمبر تا دسمبر فروٹ فلائی کے کنٹرول کیلئے



1۔ میتھائل یوجینال والے ڈبے باغات میں لگائیں

2۔ پروٹین ہائیڈرولائی سیٹ ہر 5 پودوں کے بعد ایک پودے پر تھوڑا سا سپرے کریں۔

3۔ گڑ کا شیرہ بوری پر لگا کر اس پر میلا تھیان کا سپرے کر کے ایک ایکڑ میں 15 تا 20 جگہ پر رکھیں

### ضروری ہدایات

1۔ دسمبر میں گو بر کی کھادا 40 تا 60 کلوگرام فی پودا ضرور ڈالیں۔

2۔ نومبر، دسمبر اور مئی، جون میں درخت کے تنے پر بورڈ و پیسٹ لگائیں۔

3۔ گدیڑی کی موثر تلفی کیلئے جون، نومبر اور دسمبر میں ہلکی گوڈی کر کے انڈے تلف کریں۔ رواں وقت میں اس کے خلاف سپرے کریں۔

4۔ آبپاشی ہمیشہ ہلکی کریں۔ باغات میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ زیادہ بہتر ہے نالی دار Furrow Irrigation کے ذریعے آبپاشی کی جائے۔

5۔ مندرجہ بالا تمام سفارشات کے علاوہ وقتاً فوقتاً محکمہ زراعت کے عملہ سے کسی بھی رہنمائی کیلئے لازماً رابطہ کرتے رہیں۔ محکمہ زراعت کا عملہ بھی آپ سے مقررہ اوقات میں ملتا رہے گا اور آپ ان سے تعاون فرمائیں۔

الطاف الرحمن خان

(ڈائریکٹر)

ڈاکٹر زاہد نذیر

(اسسٹنٹ ڈائریکٹر)

ادارہ برائے تحقیقات ترشاوہ باغات (CRI) سرگودھا رابطہ 0300-4436196، 048-3701312

محکمہ زراعت توسیع ضلع سرگودھا 0300-7705152، 048-9230232

محکمہ زراعت تحفظ نباتات سرگودھا 0300-7236254، 048-3710026

محکمہ فروٹ اینڈ وچیسٹبل ڈویلپمنٹ پراجیکٹ سرگودھا

0321-7964721

ڈاکٹر بشارت علی سلیم

ہیڈ کوارٹر چیف ایگزیکٹو آفیسر محکمہ زراعت توسیع سرگودھا

048-9230232، 0300-7705152

جناب محمد اعظم ٹاٹری (صدر)

کنوگر دروا یکسپورٹرایسوسی ایشن سرگودھا

فون: 0300-6062314

زاہد کیو ٹیکسٹری

6۔ کلو میٹر گولڈ مومن روڈ جھلوال