

کیمیائی زہروں کے خلاف کیڑوں کی قوت مدافعت اور اس کا علاج



ادارہ تحقیقات حشرات، ایوب ایگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ، فیصل آباد

کیڑوں کی فصل کے لیے زہروں کے خلاف قوت مدافعت کی حیثیت

گروپ	مسی جون	بروائی اگست	اگست	ستمبر	اکتوبر
گروپ 1	سفیڈ کھسی، چست تیلہ، تھرپس اور شکاری سڈی	سفیڈ کھسی، چست تیلہ، تھرپس اور شکاری سڈی	سفیڈ کھسی، چست تیلہ، تھرپس اور شکاری سڈی	سفیڈ کھسی، چست تیلہ، تھرپس اور شکاری سڈی	سفیڈ کھسی، چست تیلہ، تھرپس اور شکاری سڈی
گروپ 2	چست تیلہ 1 فی پیہ، سفیڈ کھسی 1 فی پیہ، تھرپس 1 فی پیہ	چست تیلہ 1 فی پیہ، سفیڈ کھسی 1 فی پیہ، تھرپس 1 فی پیہ	چست تیلہ 1 فی پیہ، سفیڈ کھسی 1 فی پیہ، تھرپس 1 فی پیہ	چست تیلہ 1 فی پیہ، سفیڈ کھسی 1 فی پیہ، تھرپس 1 فی پیہ	چست تیلہ 1 فی پیہ، سفیڈ کھسی 1 فی پیہ، تھرپس 1 فی پیہ
گروپ 3	چنگ کوڑ برنگا، قوت مدافعت والی اقسام کاشت کرنا	پاڑی پراسی فن، سپانکوسید، لیونیفوران	تائی لمپانم، ڈائٹینتھوران	امیڈ اکلورڈ، ایسٹا پیرڈ، کلو پاز فاس، ایمپاسکین	امیڈ اکلورڈ، ایسٹا پیرڈ، کلو پاز فاس، ایمپاسکین
گروپ 4	ناتاتی بڑھوتری	ناتاتی بڑھوتری	ڈودی پھول اور نیڈے	ڈودی پھول اور نیڈے	ڈودی پھول اور نیڈے
گروپ 5	30-0 دن	60-30 دن	90-60 دن	120-90 دن	150-120 دن

ادارہ تحقیقات حشرات، ایوب ایگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ، فیصل آباد



فون نمبر - 041-9201680
041-2656612
فیکس نمبر - 041-9201681
E-mail: director_entofsd@yahoo.com

DESIGNED BY ASSIYA PARVEEN

کم قوت مدافعت والی زہروں کا استعمال

- ☆ فائدہ مند کیڑوں کے لیے نسبتاً کم نقصان دہ زہروں کا استعمال کرنا
- ☆ مختلف گروپ کا ایک دوسرے کے متبادل طور پر استعمال کرنا
- ☆ سپرے کے دو، تین دن کے بعد زندہ بچ جانے والی سنڈیوں کی ہاتھوں سے چنائی کرنا
- ☆ زہروں کو ضرورت کے مطابق اور کیڑوں کی معاشی حد دیکھ کر استعمال کرنا
- ☆ زہروں کا ٹھیک وقت پر استعمال کرنا
- ☆ زہر کی مقرر کردہ مقدار کا استعمال کرنا
- ☆ سپرے کرنے کے لیے مناسب اور ٹھیک سپرے مشین کا استعمال
- ☆ سنڈیوں کے بہتر کنٹرول کے لیے چھوٹی سٹیج پر مقدار کردہ مقدار سے کنٹرول کرنا
- ☆ زہروں کے مختلف گروپوں کا متبادل استعمال کیڑوں کے خلاف قوت مدافعت سے بچاتا ہے۔ خاص کر کے پائز تھرائڈز اور گینو فاسفیٹ اور نیو کیمسٹری کا یکے بعد دیگرے استعمال
- ☆ ستر جسٹ کو 10:1 سے ملا کر انتہائی قوت مدافعت والی زہر سے ملا کر قابل استعمال کر قابل استعمال کرنا

میں فیصل آباد، ملتان اور بہاولپور کی پاپولیشن میں قوت مدافعت چیک کی گئی۔ ساپر میتھرین میں درمیانی درجے کی (25.31-40.95) کی قوت مدافعت نوٹ کی گئی۔ اسی طرح تھائیوڈائی کارب میں بھی ہلکے سے درمیانے درجے (15.15-26.73) کی قوت مدافعت پائی گئی۔

کیٹوری درجہ	قوت مدافعت کا حامل	قوت مدافعت کی حد
سافرینوفاس	7.13-8.75	بہت کم
کلورپائیرفاس	6.54-9.71	بہت کم
سافرین میتھرین	25.31-40.95	درمیانی
تھائیوڈائی کارب	15.53-26.76	کم سے درمیان
لیوفینوران	2.73-16.33	بہت کم سے لیکر کم
نڈوسلفان	4.56-5.58	بہت کم
ایما میکٹن	2.67-3.44	بہت کم

کیڑوں میں قوت مدافعت کنٹرول کرنے کی تدابیر

پاکستان میں کیڑوں میں قوت مدافعت کنٹرول کرنا کافی مشکل ہے کیونکہ یہاں پر کسانوں کے کپاس کاشت کرنے کے طریقے ایک دوسرے سے ہم آہنگی نہیں رکھتے مثلاً اگیتی یا پچھتی کاشت، کھادوں کا غیر متوازن استعمال اور کیڑے مار زہروں کا استعمال۔ قوت مدافعت کنٹرول کرنے کے طریقے سادہ آسان اور فصل کی پیداواری ٹیکنالوجی کے مطابق ہونے چاہیں۔ کیونکہ قوت مدافعت کی بنیادی وجہ سے ہی نئے کیڑوں کے مسائل بن رہے ہیں۔ زہروں کے مختلف گروپ کو حکمانہ سفارشات کے مطابق استعمال کرنا چاہیے اور زہروں کے استعمال کے قوت درج ذیل چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔

گئی اور سب سے زیادہ قوت مدافعت پائرا تھریڈز (سافرین میتھرین اور ڈیلٹا میتھرین) میں با ترتیب (221-247) (105-156) نوٹ کی گئی۔ جبکہ لیمینڈا سائی ہیلو تھرین میں درمیانی قسم کی قوت مدافعت اور گینوفاسفیٹ گروپ میں کلورپائی فاس میں 5.56 سے لیکر 1139 کی قوت مدافعت نوٹ کی گئی جو کہ بہت کم قسم کی قوت مدافعت ہے۔

مندرجہ ذیل ٹیبل میں زہر اور ان میں موجود قوت مدافعت کا درجہ دیا گیا ہے۔

کیٹوری درجہ	قوت مدافعت کا حامل	قوت مدافعت کی حد
سافرینوفاس	10.71-17.19	کم سے درمیانی
کلورپائیرفاس	4.70-13.33	بہت کم
سافرین میتھرین	221-247.74	کم
بائی ٹینتھرین	9.75-19.92	کم
امیڈا سائی ہیلو تھرین	62.20-70.77	درمیانی
ڈیلٹا میتھرین	105.36-15.73	بہت زیادہ
تھائیوڈائی کارب	2.23-3.77	بہت کم
ایما میکٹن	1.46-1.61	بہت کم
لیوفینوران	20.75-24.36	درمیانی

لشکری سنڈی میں قوت مدافعت

لشکری سنڈی کے خلاف پچھلے کئی سالوں میں استعمال ہونے والی زہروں کلورپائیرفاس، سافرین میتھرین، پرفینوفاس، لیوفینوران، انڈوسلفان اور ایما میکٹن

کیمیائی زہریں کیڑوں کو کنٹرول کرنے کا ایک اہم اور سستا ذریعہ ہے۔ کیمیائی زہریں استعمال کر کے ہم بہت کم وقت میں کیڑے کنٹرول کر لیتے ہیں۔ لیکن اکثر اوقات یہ بات سننے کو ملتی ہے۔ زہریں کام ٹھیک طرح سے نہیں کر رہیں۔ اس کی سب سے اہم وجہ کیڑوں کا ان کیمیائی زہروں کے خلاف قوت مدافعت کا پیدا ہو جانا ہے۔

تعریف

کیڑوں کے ایک گروپ کی خاصیت جس میں وہ ان زہروں کے خلاف زندہ رہ جائیں جس سے اسی نسل کے دوسرے کیڑے مر جائیں۔ قوت مدافعت کہلاتی ہے۔ اس کی جان کاری کرنے کے لیے ہمیں لیبارٹری میں اس زہر کا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے جس ہم LC50 کہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں زہروں کے استعمال میں ایک چیز جو بہت عام پائی جاتی ہے۔ جب کوئی نئی اور اچھی زہر آتی ہے اس کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے اور ان زہروں کے متبادل بھی کوئی اور زہر استعمال نہیں کی جاتی اور ان زہروں کو لیبل پر دی گئی مقدار سے ہٹ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے کیڑے ان زہروں کے خلاف قوت مدافعت حاصل کر لیتے ہیں شعبہ ہذا میں امریکن سنڈی، چتکبری سنڈی کی مختلف زہروں کے بارے میں قوت مدافعت کی باقاعدگی سے جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ جو کہ درج ذیل ہے۔

امریکن سنڈی میں قوت مدافعت

امریکن سنڈی کے خلاف پچھلے سالوں میں عام استعمال ہونے والی زہروں مثلاً کلورپائیرفاس، ایما میکٹن، لیوفینوران، ڈیلٹا میتھرین میں پنجاب کے تین اضلاع فیصل آباد، ملتان اور بہاولپور کی پاپولیشن میں قوت مدافعت چیک کی