



## پیداواری منصوبہ لہسن 2022-23

لہسن ایک اہم مصالحہ دار سبزی ہے جو تقریباً ہر سال اور ٹمکین ڈشز میں استعمال ہوتی ہے۔ عموماً ہر کاشتکار حسب ضرورت تھوڑا بہت رقبہ لہسن کے زیر کاشت لاتا ہے۔ لہسن دل کی بیماریوں اور بلڈ پریشر کے علاج کے لیے مفید ہے۔ لہسن بیکٹیریل کش خصوصیات کا حامل ہے۔ خشک لہسن کا پاؤڈر اور اچار بھی ڈبوں میں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال بخار، کھانسی، جلدی بیماریوں اور کان کے درد میں بھی انتہائی مفید ہے۔ لہسن کو عموماً ذائقہ بڑھانے کے لیے مصالحہ جات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

### پنجاب میں پچھلے پانچ سالوں میں لہسن کے زیر کاشت کل رقبہ، کل پیداوار اور اوسط پیداوار

سال	کل رقبہ		کل پیداوار	اوسط پیداوار	
	ہیکٹر	ایکڑ		من (40 کلوگرام) فی ایکڑ	کلوگرام فی ہیکٹر
2018-19	3306	8170	25898	7833	79.25
2019-20	4351	10752	38184	8776	88.79
2020-21	7863	19430	72834	9263	93.72
2021-22	7158	17688	55625	7771	78.62

### موزوں آب و ہوا

لہسن کی فصل کو کاشت کے وقت ٹھنڈے موسم، چھوٹے دنوں اور پکتے وقت خشک اور گرم موسم کی ضرورت ہوتی ہے۔

### لہسن کی منظور شدہ اقسام

- لہسن گلابی
- این اے آر سی-جی 1

### شرح بیج

- درمیانے اور بڑے سائز کی صحت مند 200 کلوگرام پوتھیاں فی ایکڑ استعمال کریں۔
- این اے آر سی جی-1 کے لیے بیج کی شرح 800 کلوگرام فی ایکڑ رکھیں۔
- پوتھیوں کے سائز کے حساب سے بیج کی فی ایکڑ شرح میں سے کمی بیشی کی جاسکتی ہے۔

### وقت کاشت

- شمالی پنجاب میں موزوں وقت کاشت آخر ستمبر تا وسط اکتوبر ہے
- وسطی اور جنوبی پنجاب میں کاشت کے لئے اکتوبر کا مہینہ بہترین ہے۔

## موزوں زمین

لہسن کی کاشت کے لیے زرخیز اور نرم زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھاری زمین میں گندھیاں باقاعدگی سے نہیں بنتیں۔ علاوہ ازیں برداشت کے وقت زمین خشک ہو تو گندھیاں ٹوٹ کر زخمی ہو جاتی ہیں اور جنس کی مناسب قیمت نہیں ملتی۔ اسی طرح ریتیلی زمین بھی اس کی کاشت کے لیے موزوں نہیں کیونکہ ایسی زمین میں نمی برقرار کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔

## زمین کی تیاری

بوئی کے کم از کم ایک ماہ پہلے گوبر کی گلی سڑی کھا دجسب 8 تا 10 ٹرا نی ایکڑ ڈالیں اور اچھی طرح زمین میں ملا کر پانی لگا دیں۔ بوئی سے پہلے زمین تیار کرنے کے لیے ایک مرتبہ مٹی پلٹنے والا ہل اور دو یا تین بار کلٹیو میٹر چلائیں اور بعد میں سہاگہ دے کر زمین کو ہموار کر لیں۔ بہتر ہے کہ کھیت کو لیزر لینڈ لیولر سے ہموار کریں۔

## طریقہ کاشت

تیار شدہ زمین کو پانچ مرلے کی ہموار کیا ریوں میں تقسیم کر لیں۔ پوتھیوں کو ہموار زمین پر لائنوں میں کاشت کریں۔ پوتھی کو زمین میں ایک انچ گہرا اس طرح لگائیں کہ جڑوں والا حصہ زمین میں اور نوک دار حصہ اوپر کی طرف ہو۔ پودوں کا باہمی فاصلہ 4 انچ جبکہ لائنوں کا درمیانی فاصلہ 8 تا 10 انچ رکھیں۔ بوئی سے پہلے پوتھیوں کو محکمہ زراعت کے مقامی ماہرین کے مشورہ سے سفارش کردہ پھپھوندی کش زہر لگائیں۔

## کھادوں کا استعمال

کیمیائی کھادوں کی مقدار کے تعین کے لئے زمین کا تجزیہ کروائیں۔ اوسط زرخیزی والی زمین میں لہسن کی کاشت کے لئے دی گئی سفارشات کے مطابق کھاؤ ڈالیں۔

مقدار کھاد فی ایکڑ (بوریوں میں)			خوراکی اجزاء فی ایکڑ (کلوگرام)		
گندھی بننے سے پہلے	پورے پتے نکلنے پر	بوقت بوئی منتقلی زسری	پوٹاش	فاسفورس	نائٹروجن
ایک بوری یوریا	ایک بوری یوریا	دو بوری ڈی اے پی، ایک بوری ایس او پی	25	46	64

نوٹ: این اے آر سی-1 G کی فاسفورس اور پوٹاش کی کھاد کی ضرورت دوسری مقامی اقسام سے تقریباً دو گنا ہوتی ہے۔

## جڑی بوٹیوں کی تلفی

لہسن کی فصل میں چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کا تدارک بوئی کے فوراً بعد زرعی ماہرین کے مشورہ سے مناسب زہر سپرے کر کے کریں۔ جڑی بوٹیوں کو بذریعہ گوڈی بھی تلف کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لیے فصل کو تین چار بار گوڈی کریں مگر جب فصل گندھیاں پورے سائز کی بنالے تو پھر گوڈی نہ کریں۔

## آپاشی

لہسن کی کاشت خشک زمین میں کریں اور کاشت کے فوراً بعد آپاشی کر دیں بعد ازاں آپاشی ہفتہ وار جبکہ دسمبر اور جنوری کے مہینہ میں چودہ دن کے وقفہ سے آپاشی کریں۔ جب فصل آخری مراحل میں ہو تو حسب ضرورت پانی لگائیں۔ بارش کے پانی کے نکاس کا بندوبست بہت ضروری ہے کیونکہ یہ فصل زیادہ مقدار میں پانی برداشت نہیں کر سکتی اور گندھیوں کے گل جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔

## برداشت اور سٹوریج

لہسن عام طور پر اپریل میں برداشت کیا جاتا ہے جبکہ این اے آر سی G-1 مٹی کے مہینہ میں برداشت ہوتی ہے۔ جب پتے خشک اور بھورے رنگ کے ہو رہے ہوں تو سمجھیں کہ فصل تیار ہے اور آپاشی بند کر دیں۔ لہسن کی برداشت وتر آنے پر کھرپوں کی مدد سے کریں۔ لہسن کو خشک کرنے کے لیے کسی سایہ دار جگہ یا ہوادار کمرے میں سات آٹھ دن کے لیے یکساں طور پر پھیلا دیں۔ جب اوپر سے پھلکے آسانی سے علیحدہ ہونے لگیں تو گٹھیوں کو ڈنڈیوں سمیت باندھ کر خشک اور ہوادار جگہ پر سٹوریج کر لیں۔ اس طرح لہسن لمبے عرصے تک ذخیرہ کیا جاسکتا ہے۔

## سیڈسٹاک کو توڑنا

لہسن کی قسم این اے آر سی جی-1، 15، 15 مارچ سے 15 اپریل کے درمیان پودے سے بولٹ یعنی گندلوں کے لئے سیڈسٹاک نکالنی ہے۔ ان کو شروع کے دنوں میں ہی ہاتھوں کی مدد سے توڑ دینا چاہیے تاکہ ساری خوراک بلب میں ہی جمع ہو اور پیداوار زیادہ حاصل ہو۔

## لہسن کی فصل کی بیماریاں اور ان کا انسداد

نام بیماری	حملہ کی نوعیت	انسداد
لہسن کے پتوں کی چوٹی کا سفید جھلساؤ (White tip of Garlic)	اس بیماری کی وجہ (Cladosporium) ہے اور اس کا حملہ روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ بیماری سب سے پہلے لہسن کے پتوں کے سروں سے شروع ہوتی ہے اور پتے اوپر سے سُکنے لگتے ہیں۔ حملہ کی شدت میں تمام پتے خشک ہو جاتے ہیں جس سے لہسن کی گٹھیوں کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے اور پیداوار کم ہو جاتی ہے۔	<ul style="list-style-type: none"> <li>سفرش کردہ کھادوں کا استعمال کریں۔</li> <li>پودوں کا باہمی فاصلہ سفارش کردہ ٹیکنالوجی کے مطابق رکھیں۔</li> <li>بڑی بوٹیوں کی تلفی یقینی بنائیں۔</li> <li>فصل کو پانی دن کے وقت لگائیں۔</li> <li>بیماری کے ظاہر ہوتے ہی موٹی صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل کسی ایک پھپھوندی کش زہر کا سپرے کریں۔</li> <li>ایزوکسی سٹروبن پلس ڈائی فینا کونازول بحساب 250 ملی لیٹر فی ایکڑ یا ایزوکسی سٹروبن پلس کلوروتھیلیول بحساب 500 ملی لیٹر فی ایکڑ یا فلومارف پلس فوسٹائل ایلوئمینیم بحساب 300 گرام فی ایکڑ</li> </ul>
لہسن کے پتوں اور تنے کا گلہاؤ (Stem Blight)	یہ بیماری فصل پر عمر کے دوران ہی کے ہر حصہ میں حملہ آور ہو سکتی ہے لیکن مرطوب موسم زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ نمودار موسم میں اس بیماری کے جراثیم پتوں اور تنوں پر بھورے رنگ کے دھبوں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں بعد میں ان کا رنگ سُرخنی ماٹل سا ہو جاتا ہے اور متاثرہ پتے اور تنے گلنے سُرنے لگتے ہیں۔ بیماری کی شدت کی صورت میں پودا مر جاتا ہے۔	<ul style="list-style-type: none"> <li>بیج کو بوائی سے قبل ہمیشہ پھپھوندی کش زہر لگائیں۔</li> <li>بیماری کی صورت میں مندرجہ ذیل زہروں میں سے کسی ایک کا بھر پور سپرے کریں۔</li> <li>ایزوکسی سٹروبن، ڈائی فینا کونازول بحساب 250 ملی لیٹر فی ایکڑ یا ایزوکسی سٹروبن، کلوروتھیلیول بحساب 500 ملی لیٹر فی ایکڑ یا فوسٹائل ایلوئمینیم بحساب 200 گرام فی ایکڑ</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>● کنگلی کے خلاف قوت مدافعت کی حامل اقسام کاشت کریں۔</li> <li>● بیماری کے حملہ کی صورت میں درج ذیل زہروں میں سے کسی ایک کا پانچ دن کے وقفے سے سپرے کریں۔</li> <li>● ڈائی فینا کونازول، پروپی کونازول بحساب 120 گرام یا مائیکو بیوٹائٹل 50 گرام فی ایکڑ یا ڈائی فینو کونازول 250 ملی لٹر فی ایکڑ</li> </ul>	<p>اس بیماری کی وجہ ایک پھپھوندی (Puccinia) ہے۔ یہ بیماری پتوں کے اندرونی اور بیرونی دونوں طرف نارنگی رنگ کے ابھرے ہوئے دھبوں میں ظاہر ہوتی ہے جو بعد میں پھٹ جاتے ہیں اور نارنگی رنگ کا سفوف نما تخم ارد گرد پودوں پر گرتا ہے۔ اگر مسلسل اُس اور درجہ حرارت 20 سے 21 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے، پتے چڑھڑھو کر سوکھ جاتے ہیں اور پیداوار میں کافی حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے۔</p>	<p>لہسن کی کنگلی (Garlic Rust)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● پودے سے پودے کا باہمی فاصلہ زرعی ماہرین کا تجویز کردہ رکھیں۔ زیادہ قریب لگانے کی صورت میں نمی بڑھ جاتی ہے اور بیماری کا حملہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔</li> <li>● کوشش کریں کہ دن کے وقت پانی لگائیں تاکہ ان کے پتوں پر موجود نمی کم ہو سکے اور بیماری کے اثرات سے بچا جاسکے۔</li> <li>● بیماری کی صورت میں مندرجہ ذیل پھپھوندی کش زہروں میں سے کسی ایک کا 7 دن کے وقفے کے ساتھ سپرے کریں۔</li> <li>● بیماری کی شدت میں سپرے کا وقفہ 3 دن رکھیں۔</li> <li>● فلواپز انیام، میٹالاکسل بحساب 200 ملی لٹر فی ایکڑ یا فلوماف، فوسیٹائل ایلوٹینیم بحساب 500 گرام فی ایکڑ یا مینڈی پروپامائیڈ بحساب 200 ملی لٹر فی ایکڑ یا کرزیٹ ایم بحساب 600 گرام فی ایکڑ</li> </ul>	<p>یہ بیماری پھپھوندی کی ایک قسم (Peronospora) کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بیماری پتوں اور بیج پیدا کرنے والی ڈنڈی پر سیاہی مائل روئیں دار دھبوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر موسم سرد، ابر آلود اور ساتھ ساتھ ہلکی بارش ہو تو یہ بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے۔ پورے کا پورا کھیت جھلساؤ اور مرجھاؤ کا منظر پیش کرتا ہے اور پیداوار میں 60 سے 75 فیصد تک کمی ہو جاتی ہے۔</p>	<p>روئیں دار پھپھوندی (Downy Mildew)</p>

## لہسن کے نقصان دہ کیڑے اور ان کا انسداد

انسداد	نقصان	پہچان	نام کیڑا
<ul style="list-style-type: none"> <li>● جڑی بوٹیاں تلف کریں۔ ● فصل کو گوڈی کریں۔</li> <li>● فصل کو سونا نہ آنے دیں کیونکہ خشک موسمی حالات میں اس کا حملہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔</li> <li>● حملہ معاشی حد سے بڑھنے پر کلور فینوپر 360 ایس سی بحساب 75 ملی لٹر فی ایکڑ یا سپائٹوسید 240 ایس سی بحساب 40 ملی لٹر فی ایکڑ یا میتھول 40 ایس پی بحساب 300 گرام فی ایکڑ اچھی طرح سپرے کریں۔</li> </ul>	<p>بالغ اور بچے دونوں نقصان پہنچاتے ہیں۔ حملہ خُده پودے کے پتے چڑھڑھو جاتے ہیں اور بعد میں خشک ہو کر گر جاتے ہیں۔ حملہ خُده پودے پوتھیاں نہیں بناتے۔</p>	<p>بالغ کیڑے لمبوترے اور کالے یا بھورے رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کی لمبائی تقریباً ایک ملی میٹر ہوتی ہے۔ نر بالغ بے پر ہوتے ہیں جبکہ مادہ کے پر لے نوکیلے اور پٹی جیسے ہوتے ہیں جن پر لے بال بچھلے کناروں پر ہوتے ہیں۔ شکل و شباہت میں بچے بالغ سے ملتے جلتے ہیں لیکن بے پر اور بھورے ہوتے ہیں۔ یہ کیڑا پتوں پر حرکت کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔</p>	<p>نام کیڑا تھرپس (Thrips)</p>

## زرعی معلومات کیلئے ہیلپ لائن اور ویب سائٹ

کاشتکار بہن و دیگر فصلات کے کاشتی امور کے سلسلہ میں زرعی ہیلپ لائن 0800-17000 پر پیر تا جمعہ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک فون کر کے مفید مشورے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ زراعت پنجاب کی ویب سائٹ [www.agripunjab.gov.pk](http://www.agripunjab.gov.pk) سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کاشتکار مزید معلومات کے لئے مندرجہ ذیل فون نمبر پر رابطہ کریں۔

نمبر شمار	نام ادارہ	کوڈ نمبر	فون دفتر	ای میل ایڈریس
1	ڈائریکٹر جنرل زراعت (توسیع و ایڈیوٹریسٹری) پنجاب لاہور	042	99200732	agriextpb@gmail.com
2	ڈائریکٹر زراعت کوآپریٹیشن (ایف ٹی و اے آر) پنجاب لاہور	042	99200741	dacpunjab@gmail.com
3	پلانٹ پتھالوجی ریسرچ انسٹیٹیوٹ جھنگ روڈ فیصل آباد	041	9201683	directorppri@yahoo.com
4	نظامت سبزیات ایوب زرعی ترقیاتی ادارہ جھنگ روڈ فیصل آباد	041	9201678	directorvegetable@yahoo.com
5	انٹومالوجیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد	041	9201680	director_entofsd@yahoo.com
6	ڈائریکٹر زراعت (ہارٹیکلچر توسیع)، لاہور	042	99203454	dahorticulture.ext@gmail.com
7	ڈائریکٹر کراپ پورٹنگ سروس پنجاب، لاہور	042	99330378	dacrspunjab@hotmail.com

### ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچرل ڈیپارٹمنٹ

نمبر شمار	نام ادارہ	کوڈ نمبر	فون دفتر	ای میل ایڈریس
1	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی اینڈ اے آر) شیخوپورہ	056	9200291	dafarmskp@gmail.com
2	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی اینڈ اے آر) گوجرانوالہ	055	9200200	daftgrw@gmail.com
3	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی اینڈ اے آر) وہاڑی	067	9201188	dafarmvehari@yahoo.com
4	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی اینڈ اے آر) سرگودھا	048	3711002	arfsgd49@yahoo.com
5	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی اینڈ اے آر) کروڑ، لیہ	0606	810113	daftkaror@gmail.com
6	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی اینڈ اے آر) رحیم یار خان	068		dafttrykhan@gmail.com
7	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی اینڈ اے آر) چکوال	0543	571110	ssmsarfchk@hotmail.com

### دفاتر نظامت و نائب نظامت زراعت (توسیع) پنجاب

نمبر شمار	نام ادارہ	کوڈ نمبر	فون دفتر	ای میل ایڈریس
1	نظامت زراعت (توسیع) لاہور	042	99201171	daelahore@yahoo.com
2	لاہور	042	99200736	doaelhr2009@yahoo.com
3	قصور	049	9250042	ddaeksr@gmail.com
4	شیخوپورہ	056	9200263	ddaeskp@gmail.com
5	نکاہ صاحب	056	9201134	doextension_nns@yahoo.com

daextfsd@gmail.com	9200755	041	نظامت زراعت (توسیع) فیصل آباد	6
ddaextfsd@gmail.com	9200754	041	فیصل آباد	7
ddajhang@gmail.com	9200289	047	جنگ	8
doagriextok@live.com	9201140	046	ٹوبہ ٹیک سنگھ	9
chiniot.agri@yahoo.com	9210171	047	چنیوٹ	10
daextgujanwala@gmail.com	9200198	055	نظامت زراعت (توسیع) گوجرانوالہ	11
ddaextensiongrw@gmail.com	9200195	055	گوجرانوالہ	12
doagriextension@gmail.com	920062	0547	حافظ آباد	13
ddaegujrat@gmail.com	9260346	053	گجرات	14
doa_extmbdin@yahoo.com	650390	0546	منڈی بہاؤ الدین	15
doanarawal@yahoo.com	2413002	0542	نارووال	16
doaextskt@yahoo.com	9250311	052	سیالکوٹ	17
darawalpindi@gmail.com	9292060	051	نظامت زراعت (توسیع) راولپنڈی	18
do.agriext.rwp.pk@gmail.com	9292160	051	راولپنڈی	19
doaextckl@gmail.com	551556	0543	پکووال	20
doaejlm@yahoo.com	9270324	0544	بہلم	21
doa_agriext_atk@yahoo.com	9316129	057	اتک	22
director.agri.sgd@gmail.com	9230526	048	نظامت زراعت (توسیع) سرگودھا	23
doaxentionsargodha@gmail.com	9230232	048	سرگودھا	24
doaxtbkr@yahoo.com	9200144	0543	بکر	25
doaxtkhb@yahoo.com	920158	0454	خوشاب	26
doagri.extmwi@gmail.com	920095	0459	میانوالی	27

daextsahiwal@gmail.com	4400198	040	نظامت زراعت (توسیع) ساہیوال	28
doaextsahiwal@yahoo.com	9330185	040	ساہیوال	29
doagriextok@live.com	9200264	044	اوکاڑہ	30
doapakpattan@gmail.com	921046	045	پاکپتن	31
daextmultan@gmail.com	9200317	061	نظامت زراعت (توسیع) ملتان	32
doaextmultan@hotmail.com	9200748	061	ملتان	33
doagriculturekw@gmail.com	9200060	065	خانپوال	34
doalodhran@gmail.com	921106	0608	لودھراں	35
doaextvehari@hotmail.com	9201185	067	وہاڑی	36
directoragriextbwp@gmail.com	9255181	062	نظامت زراعت (توسیع) بہاولپور	37
doaextbwp2010@gmail.com	9255184	062	بہاولپور	38
ddaextbwn@ygmail.com	9240124	063	بہاولنگر	39
doagriryk@yahoo.com	9230129	068	رحیم یار خان	40
daextdgk@gmail.com	9260142	064	نظامت زراعت (توسیع) ڈیرہ غازی خان	41
ddaextdgk@gmail.com	9260143	064	ڈیرہ غازی خان	42
doaext.layyah@gmail.com	920301	0606	لیہ	43
doarajanpur@gmail.com	920084	0604	راجن پور	44
ddaagriextmzg@ygmail.com	9200041	066	مظفر گڑھ	45

☆☆☆

تیار کردہ: نظامت زراعت کوآرڈینیشن (فارمزٹریننگ اینڈ ایڈیوٹوریسریج) پنجاب لاہور۔ منظور کردہ: نظامت اعلیٰ زراعت (توسیع واڈیوٹوریسریج) پنجاب لاہور  
ڈیزائننگ و اشاعت: نظامت زرعی اطلاعات پنجاب، 21۔ سرآغا خان سوئم روڈ لاہور

اشاعت: 1000

اشاعت: 2022-23