



خطہ پوٹھوار میں زیتون کی کاشت

سالانہ کیلنڈر



تحقیقاتی و تربیتی ادارہ برائے زیتون
چکوال

تحقیقاتی و تربیتی ادارہ برائے زیتون چکوال
Center of Excellence For Olive Research & Training
(CEFORT) Chakwal

فون نمبر: 0543-662012

ای میل: cefortpak@yahoo.com

نومبر

- ☆ پھل کی برداشت اور سنبھال کا کام مکمل کر لیں۔
- ☆ چھوٹے پودوں کی آپہاشی کا عمل جاری رکھیں۔
- ☆ بڑے اور پھلدار درختوں کی آپہاشی کا کام بند کر دیں تاکہ پودے خوابیدگی کے مرحلہ میں داخل ہو سکیں۔
- ☆ پھلدار پودوں کی شاخ تراشی کے لیے انتظامات مکمل کر لیں۔

دسمبر

- ☆ نئے باغات لگانے کے لیے داغ بیل (Layout) کا کام مکمل کر کے 3x3x3 کے گڑھے کھودنے کا کام مکمل کریں مزید اس بات کا خیال رکھیں کہ گڑھے کی تہ پتھر یلی یا بہت زیادہ سخت نہ ہو۔
- ☆ کھودے ہوئے گڑھوں میں گڑھے سے نکالی گئی چھانچ اور پر والی مٹی میں بھل کی یکساں مقدار ملا کر اس میں 50 کلوگرام گوبر کی گلی سڑی ہوئی کھاد 500 گرام ڈائی امونیم فاسفیٹ، 250 گرام پوٹاشیم سلفیٹ اور 40 گرام کاربونیفوران ملا کر گڑھے میں ڈال دیں اور اوپر والی سطح پر عام مٹی ڈال کر گڑھے کو بھر کر پانی لگا دیں۔
- ☆ بڑے پھلدار درختوں کو خوابیدگی میں رکھنے کے لیے آپہاشی کا کام بند کریں۔
- ☆ چھوٹے پودوں میں گوڈی کر کے زمین نرم کریں اور پانی لگائیں تاکہ پودے سردی کی شدت سے محفوظ رہ سکیں۔
- ☆ دیر سے پکنے والی اقسام کا پھل برداشت کے بعد مناسب طریقہ پر سنبھال لیں۔
- ☆ زیتون کے چھوٹے پودوں کی آپہاشی جاری رکھیں اور تین سال تک کی عمر کے پودوں کو 70 سے 130 گرام نائٹروجن، 100 سے 150 گرام فاسفورس اور 100 سے 200 گرام پوٹاش ڈالیں۔
- ☆ زیتون کے ہر بار آور پودے کو 400 سے 500 گرام نائٹروجن، 300 سے 400 گرام فاسفورس اور 600 گرام پوٹاش ڈالیں۔
- ☆ پھلدار پودوں کی شاخ تراشی کا عمل شروع کر لیں۔

ستمبر

- ☆ زیتون کی اگتی اور اچار والی (موٹے پھل والی) اقسام کی برداشت کرتے وقت پھل کا سائز اور پختگی کے لحاظ سے انہیں علیحدہ علیحدہ رکھیں اور ان کی سنبھال اور فروخت کا کام جاری رکھیں۔
- ☆ جتنا پھل آپ سنبھال سکتے ہیں اتنا ہی توڑیں۔
- ☆ جن پودوں سے پھل برداشت کر لیا گیا ہے ان کو فاسفورس 300 سے 400 گرام فی پودا اور پوٹاش 600 سے 750 گرام فی پودا ڈالیں۔
- ☆ آپہاشی کا عمل حسب ضرورت جاری رکھیں۔
- ☆ کھودے ہوئے گڑھوں میں گڑھے سے نکالی گئی چھانچ اور پر والی مٹی میں بھل کی یکساں مقدار ملا کر اس میں 50 کلوگرام گوبر کی گلی سڑی ہوئی کھاد 500 گرام ڈائی امونیم فاسفیٹ، 250 گرام پوٹاشیم سلفیٹ اور 40 گرام کاربونیفوران ملا کر گڑھے میں ڈال دیں اور اوپر والی سطح پر عام مٹی ڈال کر گڑھے کو بھر کر پانی لگا دیں۔
- ☆ پودوں کی بنیاد سے نکلنے والے سکرز کو کاٹ دیں۔
- ☆ وتر آنے پر نئے باغات لگانے کا کام شروع کر دیں۔

اکتوبر

- ☆ تیار پھل کو برداشت کے بعد فروخت اور مصنوعات سازی کا کام جاری رکھیں۔
- ☆ تیل نکالنے کے لیے متعلقہ تیل کشید کرنے والی مشینوں سے اپنی باری کا تعین یقینی بنائیں تاکہ بروقت معیاری تیل کشید کیا جاسکے۔
- ☆ جن پودوں کو اب تک کھاد کی خوراک نہیں دی گئی ان کو نائٹروجن 300 سے 500 گرام فی پودا فاسفورس 300 سے 400 گرام فی پودا اور پوٹاش 600 سے 750 گرام فی پودا ڈالیں۔
- ☆ اگر زیتون کے باغ میں کوئی اور فصل مثلاً گندم وغیرہ کاشت کرنے کا پروگرام ہو تو زمین تیار کر کے کاشتکاری کا عمل مکمل کر لیں۔
- ☆ نئے پودے لگانے کا کام جلد از جلد مکمل کر لیں۔
- ☆ چھوٹے پودوں کی آپہاشی حسب ضرورت جاری رکھیں۔
- ☆ پودوں کے نیچے جڑی بوٹی اور گھاس کو ختم کرنے کے لیے گلائیفوسیٹ کا سپرے 2.5 ملی لیٹر فی لیٹر پانی کے حساب سے پودے کے تنے سے 5 سے 10 انچ دور سپرے کریں۔

جنوری

- ☆ پھل آور پودوں کی شاخ تراشی کریں۔
- ☆ چھوٹے پودوں میں دیمک کے کنٹرول کے لیے کلوروپیری فاس، فہپر وٹل اور ایمیڈ اکلورپرڈ کی تجویز کردہ مقدار کا استعمال کریں۔
- ☆ زیتون کے ہر بار آور پودے کو 400 سے 500 گرام نائٹروجن، ڈالیں۔
- ☆ زیتون کے چھوٹے پودوں کی آپاشی جاری رکھیں اور تین سال تک کی عمر کے پودوں کو 100 سے 200 گرام نائٹروجن، 100 سے 150 گرام فاسفورس اور 100 سے 200 گرام پوناش ڈالیں۔
- ☆ نئے باغات لگانے کے لیے داغ نیل اور گڑھے نکالنے کا کام مکمل کر لیں۔
- ☆ پھلدار پودوں کی شاخ تراشی کا عمل مکمل کر لیں۔

فروری

- ☆ زیتونی سلڈ سے بچاؤ کے لیے کیمیائی زہروں بانی فینتھرین (10EC)، امیڈ اکلورپرڈ، سپائوسید، تھامیا میتھوسکم یا نائیم پازام میں سے کسی بھی زہر کے محلول سے پودے کے تمام حصے اچھی طرح سپرے کریں اگر ممکن ہو تو درختوں کے نیچے زمین پر سپرے کر دیں۔
- ☆ چھوٹے پودوں کا ڈھانچہ بنانے کے لیے ان کی شاخ تراشی کریں۔
- ☆ چھوٹے پودوں کی مناسب آپاشی جاری رکھیں۔
- ☆ وتر آنے پر نئے باغات لگانے کا کام شروع کر دیں۔

مارچ

- ☆ چھوٹے پودوں کی شاخ تراشی اور آپاشی کا کام جاری رکھیں۔
- ☆ نئے باغات لگانے کا کام مکمل کر لیں۔
- ☆ نئے لگائے گئے پودوں کے ساتھ چھڑی یا پلاسٹک کا پائپ لگا کر پودوں کو سیدھا کھڑا ہونے کے لیے مدد فراہم کریں۔
- ☆ نئے باغات میں دیمک کے کنٹرول کے لیے کلوروپیری فاس، فہپر وٹل اور ایمیڈ اکلورپرڈ کی تجویز کردہ مقدار کا استعمال کریں۔
- ☆ چھوٹے پودوں کی شاخ تراشی اور آپاشی کا کام جاری رکھیں۔
- ☆ پودوں کی بنیاد سے نکلنے والے اسکرز کو کاٹ دیں۔

اپریل

- ☆ ہلکی آپاشی کا کام حسب ضرورت جاری رکھیں۔
- ☆ چھوٹے پودوں کی تربیت اور آپاشی کا عمل جاری رکھیں۔
- ☆ پودوں کے تنوں پر چونا اور نیلا تھوٹھا کا پیسٹ لگا دیں۔
- ☆ دیمک کے کنٹرول کے لیے کلوروپیری فاس، فہپر وٹل اور ایمیڈ اکلورپرڈ کی تجویز کردہ مقدار کا استعمال کریں۔
- ☆ پودوں کے نیچے جڑی بوٹی اور گھاس کو ختم کرنے کے لیے گلائیفوسیٹ کا سپرے 2.5 ملی لیٹر / فی لیٹر پانی کے حساب سے پودے کے تنے سے 5 سے 10 انچ دور سپرے کریں۔
- ☆ زیتون کے ہر بار آور پودے کو 400 سے 500 گرام نائٹروجن ڈالیں۔
- ☆ زیتون کے چھوٹے پودوں کی آپاشی جاری رکھیں اور 70 سے 130 گرام نائٹروجن ڈالیں۔

مئی

- ☆ آپاشی کا عمل حسب ضرورت جاری رکھیں۔
- ☆ چھوٹے پودوں کو گرمی اور پانی کی کمی سے بچانے کی طرف خاص توجہ دیں۔
- ☆ پودوں کے نیچے سے گھاس اور جڑی بوٹیوں کا تدارک کریں۔
- ☆ چھوٹے پودوں میں دیمک کے کنٹرول کے لیے کلوروپیری فاس، فہپر وٹل اور ایمیڈ اکلورپرڈ کی تجویز کردہ مقدار کا استعمال کریں۔
- ☆ غیر بار آور پودوں کی شاخ تراشی کا عمل شروع کر لیں۔

جون

- ☆ آپاشی کا عمل جاری رکھیں۔ بارش نہ ہونے کی صورت میں وقفے وقفے سے ہلکا پانی لگائیں۔
- ☆ پودوں کے گرد پانی کے دور دست کر دیں تاکہ بارش کا کچھ پانی پودے کی جڑوں کے قریب ہی جذب ہو جائے اور فالتو پانی یا آسانی جڑوں کے نظام سے ڈورنکل جائے۔
- ☆ چھوٹے پودوں میں دیمک کے کنٹرول کے لیے کلوروپیری فاس، فہپر وٹل اور ایمیڈ اکلورپرڈ کی تجویز کردہ مقدار کا استعمال کریں۔
- ☆ پودوں کے نیچے جڑی بوٹی اور گھاس کو ختم کرنے کے لیے گلائیفوسیٹ کا سپرے 2.5 ملی لیٹر / فی لیٹر پانی کے حساب سے پودے کے تنے سے 5 سے 10 انچ دور سپرے کریں۔
- ☆ غیر بار آور پودوں کی شاخ تراشی کا عمل مکمل کر لیں۔

جولائی

- ☆ آپاشی کا عمل حسب ضرورت جاری رکھیں۔
- ☆ نئے باغات لگانے کے لیے داغ نیل اور گڑھے نکالنے کا کام مکمل کر لیں۔
- ☆ کھودے ہوئے گڑھوں میں گڑھے سے نکالی گئی چھانچ اور پوٹالی میں بھل کی یکساں مقدار ملا کر اس میں 50 کلوگرام گوبری گلی سٹری ہوئی کھاد 500 گرام ڈائی امونیم فاسفیٹ، 250 گرام پوناشیم سلفیٹ اور 40 گرام کاربونیوران ملا کر گڑھے میں ڈال دیں اور اوپر والی سطح پر عام مٹی ڈال کر گڑھے کو بھر کر پانی گادیں۔
- ☆ بارش کی وجہ سے ہونے والے زمینی کٹناؤ کو درست کرتے رہیں۔
- ☆ پھلدار درختوں کا جائزہ لیں اگر پھل یا پتوں پر کسی بیماری کا حملہ نظر آئے تو مناسب زہر سے تدارک کریں۔
- ☆ زیتون کے پھل کی منڈی اور کاروباری مراکز سے متعلق معلومات حاصل کریں۔
- ☆ متعلقہ محکمہ اور دوسرے باغبان حضرات سے صلاح مشورہ کا عمل جاری رکھیں۔
- ☆ بارش کی وجہ سے زیادہ پانی جمع ہونے کی صورت میں پانی کے اخراج کا بندوبست کریں۔
- ☆ زیتون کے ہر بار آور پودے کو 400 سے 500 گرام نائٹروجن 300 سے 400 گرام فاسفورس اور 750 گرام پوناش ڈالیں۔
- ☆ زیتون کے چھوٹے پودوں کی آپاشی جاری رکھیں اور تین سال تک کی عمر کے پودوں کو 70 سے 180 گرام نائٹروجن، 100 سے 150 گرام فاسفورس اور 100 سے 200 گرام پوناش ڈالیں۔

اگست

- ☆ درختوں سے پھل توڑنے کے لیے تمام امور ضروری لوازمات مثلاً مزدور، سیڑھی، تریپال، پلاسٹک کی ٹوکریوں وغیرہ کا انتظام کر لیں۔
- ☆ پھل کی فروخت اور مصنوعات سازی سے متعلق معلومات حاصل کر لیں۔
- ☆ اچار بنانے کے لیے موٹے پھل والی اقسام مثلاً گیملک، ارلک، ہوجی بلنکا، ہامدی کا انتخاب کریں اور سبز حالت میں برداشت کریں۔
- ☆ پھل سے مرہ اور شربت وغیرہ بنانے کے لیے پھل کے پکنے کا انتظار کریں۔ آدھا پکا ہوا پھل توڑ کر اس سے مصنوعات سازی کریں۔
- ☆ نئے باغات لگانے کے لیے داغ نیل اور گڑھے نکالنے کا کام مکمل کر لیں۔
- ☆ نئے باغات لگانے کے لیے پودے حاصل کرنے کے لیے متعلقہ اداروں سے مشورہ کریں اور پودے مختص کروائیں۔